

VLEES- EN AASVlieg

<i>Latijns:</i>	<i>Blauwe vleesvlieg</i> <i>Grauwe vleesvlieg</i> <i>Groene aasvlieg</i>	> <i>Callip Vicina Robineau-Desviody</i> > <i>Sarcohaga Carnaria L.</i> > <i>Lucilia Sericata Meigen</i>
<i>Familie:</i>	<i>Vleesvliegen</i>	
<i>Orde:</i>	<i>tweevleugeligen</i>	
<i>Status:</i>	<i>niet beschermd</i>	

Uiterlijk/kenmerken

Vleesvlieg zijn ca. 1-1½ cm groot. De kleuren van het imago verschillen per soort:

- Blauwe vleesvlieg: Blauwzwart met roden ogen.
- Grauwe vleesvlieg: Grijs met rode ogen.
- Groene aasvlieg: Glanzend groen.



In Nederland komen ca. 80 verschillende vleesvliegen voor. In de volksmond worden ze ook wel bromvliegen genoemd. De larven leven hoofdzakelijk in rottend materiaal, bij voorkeur in vlees.

Ontwikkeling/leefwijze

Vleesvliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Het wijfje legt honderden eitjes in vlees, rottend materiaal, uitwerpselen of in gebouwen op dode ratte, muizen of vogels. De groene aasvlieg legt ook eitjes in zweren en/of sneden in de huid van levende schapen. Na ca. één dag komen de larven uit, ook wel maden genoemd, en doen zich vervolgens te goed aan het aanwezige materiaal (dus ook levend schapenvlees!). Hierna volgt het popstadium dat gemiddeld ca. 8-13 dagen duurt. Een volwassen vleesvlieg leeft zo'n 3 weken.



Schuilplaatsen

Het wijfje van de vleesvlieg komen op vlees af en ruiken de geur van rottend vlees op grote afstand, terwijl het mannetje de voorkeur heeft voor bloemen. Daarom komen er in gebouwen hoofdzakelijk wijfjes voor. De groene aasvlieg komt niet vaak binnen voor.

Mogelijke risico's/schade/hinder

- Overdracht van schadelijke virussen, bacteriën of andere micro-organismen (via poten, monddelen en/of uitwerpselen)
- Verontreiniging van vlees en vleeswaren
- Schade aan schapen door groene aasvlieg (groeistop, infectie, etc.)

Wering

- Vlees en vleeswaren koel en afgedekt opslaan.
- Dode dieren zo snel mogelijk afvoeren en, indien mogelijk, gekoeld opslaan.
- Kadavertonnen na lediging grondig reinigen.
- Plaats, waar mogelijk, horren voor openstaande deuren en ramen.

Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een schoonmaakplan op.

Bestrijding

Neem direct de bron weg en reinig de omgeving vervolgens grondig. Indien noodzakelijk, kunt u een (plaatselijke) chemische bestrijding laten uitvoeren door ten Dijk Ongediertebestrijding.