

LOOPKEVER

Latijns: Aarbeiloopekever > *Harpalus Rufipes Rufipes O.F. Müller*
Gewone Streepjesloopekever > Pterostichus Melanarius Illger
Familie: Zwartlijven
Orde: kevers
Status: beschermd



Uiterlijk/kenmerken

Beide typen kevers zijn volgroeid ca. 1½ cm lang. Ze zijn glanzend, donker gekleurd en hebben een enigszins afgeplat lichaam. Loopkevers kunnen zowel snel lopen, als ook snel vliegen.

Ontwikkeling/leefwijze

De loopkevers hebben een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Tijdens het afzetten worden de eitjes bevrucht met sperma, dat door het vrouwtje in de zogenaamde 'spermatheca' bewaard is. Het aantal eitjes kan oplopen van enkele tientallen tot wel 200 stuks per afzet. De larven van de loopkever leven van dierlijke eiwitten en vervellen voor het popstadium drie keer. Loopkevers kunnen gemiddeld 2 jaar oud worden.

Zowel de kever als de larve zijn echte rovers, ze voeden zich met wormen, slakken en insecten. Enkele loopkevers doen zich ook tegoed aan zacht fruit. De aardbeiloopekever eet ook de pitjes/zaadjes van de aardbei.

Schuilplaatsen

De aardbeiloopekever komt vooral voor op of in droge zandgrond en kan als larve of als kever overwinteren. De loopkevers zijn meestal 's nachts actief en komen op licht af. Overdag verschuilen ze zich onder stenen en hout e.d. Loopkevers komen veel voor in tuinen met afwisselende beplanting.

Mogelijke risico's/schade/hinder

- Schade aan aardbeien in de tuinbouw (aanzienlijke schade mogelijk!)

Wering/Bestrijding

Mochten loopkevers een gebouw binnen gekomen zijn, vang deze dan weg en zet ze buiten uit. Er is geen gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan.